

欧米では、その姿形からシルバーフィッシュ(銀色の魚)と呼ばれており、古くから和紙や書物につく虫として知られています。

### ■ どんな虫？

- ・体はウロコでおおわれ、銀色の光沢があります。
- ・書籍、壁紙のノリや衣類、絵画、乾燥食品なども食べます。
- ・押入れの中、畳の下、食器棚の中や裏などの暗くて湿っぽいところに潜みます。
- ・夜間に活動して、すばやく走りまわります。



セイヨウシミ

### ■ 対策は…

- ・室内や床下の乾燥に心がけ、押入れの中や食器棚、タンスの裏側などの掃除をしましょう。
- ・引き出しや戸棚の中は、中の物を出して掃除をしましょう。

## カマドウマ

### 不快な虫

かまどのような薄暗いところにいて、馬のように飛び跳ねる虫なので、「カマドウマ」と名付けられたようです。

夜になると台所やトイレなどに出てきて驚かせることがあります。が、衛生的な害はありません。



カマドウマの一種

## ■ どんな虫？

- ・腐った木や石の下、床下、地下室などの涼しくて、暗く湿気が多いところを好みます。
- ・雑食性で野菜や昆虫の死がいなどを食べます。
- ・夜行性で、夜になるとエサを探しに台所やトイレなどに出てきます。

## ■ 対策は…

- ・戸棚の裏の掃除や、放置している食品を整理しましょう。
- ・床下や家のまわりの石や雑草などを片づけましょう。

# ワラジムシ

## 不快な虫

春先に、室内に出現することがあります。



ワラジムシ

## ■ どんな虫？

- ・家屋周囲の玉砂利や腐敗した植物、置き石や朽ち木の下などに生息します。
- ・雑食性で、湿った落ち葉や草の根、死んだ虫、残飯などをエサにしています。
- ・秋口に越冬のため家屋の床下に侵入し、春先、床下から屋外に移動する際に、室内に現れます。

## ■ 対策は…

- ・家の周囲の落ち葉や朽ち木などを片づけましょう。
- ・秋に床下に侵入するので、この時期に、家屋の基礎部に殺虫剤や洗剤を混ぜたニコチン汁を塗るとよいでしょう。
- ・床下換気口に網を張ると侵入を防止できます。


## 室内で発見した時は

- ・衛生的な害はないので、捕まえて外に出しましょう。

山ろく地帯での発生が多く、秋に屋内に侵入して、不快な臭気を放ちます。



壁についたスコットカメムシ



スコットカメムシ

### どんな虫？

- ・春から秋頃まで、山林などに生息しています。
- ・10月中旬頃、越冬のため屋内へ侵入します。春先になると、越冬を終えて野外に戻ります。
- ・体が扁平なので、窓枠や溝、換気口など、ごく狭い場所からでも侵入することができます。
- ・森林を背にした白壁の家が侵入被害を受けやすいようです。
- ・分泌される臭気は、手につくと取れにくく、屋外に干した洗たく物を汚すことがあります。

### 対策は…

- ・屋外の広範囲に生息する虫なので、発生源を抑えることは出来ません。
- ・家屋への侵入が始まる前に、大きな穴をふさぎ、窓枠や溝、換気口の周囲などに専用の殺虫剤を散布しておくといでしょう。

### 室内で発見した時は

- ・ガムテープなどでつぶさないように捕まえ、処分しましょう。
- ・多数侵入されたときは、くん煙剤を利用し、すき間に潜入しているカメムシを室内に追い出して捕まえる方法もあります。

# ゲジ類・ヤスデ類

不快な虫

多くの脚を持つグロテスクな虫で、しばしば室内に侵入して人を驚かせますが、咬んだり刺したりすることはありません。

## ■ どんな虫？

### ゲジ類

- ・石や落ち葉の下、コンクリートの裂け目などに生息します。
- ・小さな昆虫やクモ類を捕食します。
- ・春から秋にかけて、エサを求めて室内に侵入してくることがあります。



ゲジの一種

### ヤスデ類



ヤスデの一種

- ・石の下や堆肥の中など、日当たりが悪く湿気の多い場所に生息します。
- ・腐った植物の葉などを食べます。
- ・雨の日の前後に、壁や塀に集団で這い上がり、室内に侵入することがあります。

## ■ 対策は…

- ・家屋周囲の石や落ち葉などを片づけ、生息しやすい場所を作らないようにしましょう。
- ・室内への侵入を防ぐため、建物の周囲や腰回りに帯状に殺虫剤を散布するとよいでしょう。

### 室内で発見した時は

- ・衛生的な害はないので、捕まえて外に出しましょう。

食べ物にとまったり、室内を飛びまわり不快感を与えるイエバエ類は、下水道の普及やごみ収集の徹底などにより少なくなりました。

春～秋  
不潔感、不快感

### ■ どんな虫？

産卵数が多く、短期間で卵から成虫になります。発生のピークは7～8月です。

### イエバエ

- ・でん粉質の食品や牛乳を好み、生ごみなどに発生します。
- ・幼虫は典型的なウジ型です。



イエバエ類

### ヒメイエバエ

- ・イエバエより小さい種で、家の中を数匹で輪を書くように飛びまわり、生ごみ、漬物おけなどに発生します。
- ・幼虫は褐色で扁平な形をしています。

### ■ 対策は…

- ・生ごみは、ふたつきの容器に保管しましょう。
- ・成虫は生ごみ臭などに寄ってくるので、網戸を設置しましょう。
- ・ペットのフンはすぐに片付けましょう。
- ・自宅で堆肥を作る場合は、ふたつきのコンポスト容器を使用し、ウジ対策として、消石灰や石灰窒素を散布するとよいでしょう。

### 豆知識～ウツキイエバエモドキ

春先か晩秋に、大発生することがあります。足が黄色いのが特徴です。成虫は生ごみなどには集まりません。晩秋には、越冬のため、大量の成虫が室内に侵入し、不快に感じることがあります。



ウツキイエバエモドキ

室内で小さな虫が飛び回っていることがあります。その多くは「コバエ類」と総称される1～5mmほどのハエの仲間です。

不潔感  
不快感

### ■ どんな虫？

#### ショウジョウバエ類 (キイロショウジョウバエ)


- ・眼が赤く、食品の発酵臭に引き寄せられ屋内に侵入します。
- ・腐敗した果実、ごみ置き場などに発生します。



ショウジョウバエ類

#### ノミバエ類

- ・後脚が発達しており、すばやく動き回ります。
- ・腐敗した植物、漬物、堆肥やごみ置き場などに発生します。



ノミバエ類

#### クロバネキノコバエ類

- ・屋外性の虫で、偶発的に屋内に侵入したり、植木鉢の肥料などからも発生します。
- ・分類上、力に近い種類です。



クロバネキノコバエ類

#### チョウバエ類

- ・体全体が毛で覆われ、ひらひらと飛びます。
- ・汚泥のたまった下水トラップや、浴槽下などから発生します。

### ■ 対策は…

- ・成虫を引きつける生ごみなどは、ふたつきの容器に入れましょう。
- ・外から入ってこないように、目の細かな網戸を設置しましょう。

#### 発生した時は

- ・発生原因を取り除きましょう。  
例：ごみ箱の確認、下水トラップの掃除
- ・市販のハエとり剤を使用しましょう。  
誘導式：ショウジョウバエ類に有効  
偶発式：全てのコバエ類で有効



チョウバエ類